

KULLANMA TALİMATI

SUPRAVİT® PEDİATRİK Şurup Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** 2500 IU A vitamini, 0.9 mg B₁ vitamini, 1 mg B₂ vitamini, 1.3 mg B₆ vitamini, 45 mg C vitamini, 400 IU D vitamini, 8.94 mg E vitamini, 85 mcg D-biotin, 3.5 mg dekspantenol, 11 mg nikotinamid
- **Yardımcı maddeler:** Ksilitol, gliserol, propilen glikol, kremofor RH40, DL-Lakton %100, sodyum benzoat, sodyum hidroksit, etanol %96, limon aroması, sodyum hidroksit veya susuz sitrik asit, demineralize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. SUPRAVİT® PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?
2. SUPRAVİT® PEDİATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SUPRAVİT® PEDİATRİK nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SUPRAVİT® PEDİATRİK'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. SUPRAVİT® PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?

- SUPRAVİT® PEDİATRİK, dengeli oranlarda bir araya getirilmiş bir vitamin şurubudur. İçeriğindeki vitamin miktarları 2-12 yaş arasındaki çocukların günlük gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanmıştır.
- 100 mililitrelik şişelerde bulunur.
- İçeriğindeki vitaminlerin eksikliğinin görüldüğü veya gereksiniminin arttığı durumlarda eksikliğin giderilmesinde kullanılır. Şu durumlarda takviye gerekebilir:
 - Ani kilo kaybı, dengesiz ve yetersiz beslenme, günlük vitamin ihtiyacını karşılamayan beslenme, (örn; süt alımının olmadığı vejetaryen diyetler)

- Yanıklar, ateş, kronik ateş, kronik hemodiyaliz, karaciğer-safra kanalı hastalıkları, hipertiroidizm (tiroid bezinin fazla çalışması, belirtileri; metabolizmada hızlanma, kilo kaybı, terleme, güçsüzlük), uzamış hastalıklar/enfeksiyonlar, bağırsak hastalıkları, pankreas yetmezliğine bağlı olarak besinlerin yetersiz emilimi, protein eksikliği, yağ emiliminin bozulduğu durumlar
- Ağız- boğaz hasarları, sarılık

2. SUPRAVİT® PEDIATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUPRAVİT® PEDIATRİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer çocuğunuzun;

- İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine alerjisi varsa
- Hipervitaminoz A ve D'si (vücuttaki vitamin fazlalığı) varsa
- Hiperkalsemisi (Kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden fazla bulunması) varsa
- Retinoid tedavisi (Epitel hücrelerin çoğalmasını engelleyen A vitamini sentetik türevi bir ilaç ile yapılan tedavi) devam ediyorsa

SUPRAVİT® PEDIATRİK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer çocuğunuz aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsa,

- D vitamini içeren ilaçlar
- A vitamini içeren ilaçlar
- Anestezi için kullanılan barbitüratlar
- Nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SUPRAVİT® PEDIATRİK'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ölçüğünde 100 mg'dan az etanol (alkol) içerir.

Bu tıbbi ürün her 5 ml'sinde 3,9 mg sodyum ihtiva eder. Yani esasında "sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında SUPRAVİT® PEDIATRİK'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

- Antikonvülsanlar (Özellikle çizgili kasların şiddetli bir şekilde ve istem dışı kasılmasını engelleyen ilaç grubu)
- Anestezi için kullanılan barbitüratlar

- Ganglionik bloker (Sinir hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bölgelerde sinir iletimine engel olarak kan basıncını düşüren ilaçlar)
- Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayini gerektiğinde (etkileşimden dolayı bu yöntem ile yapılan tayin yanlış sonuç verebilir)

Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SUPRAVİT® PEDİATRİK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça 6 yaşından küçük çocuklara ½ (yarım) ölçek 6 yaşından büyük çocuklarda günde 1 ölçek veriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

SUPRAVİT® PEDİATRİK'i 6 yaşından küçük çocuklara su, meyve suyu veya mamaya karıştırarak, 6 yaşından büyük çocuklara kahvaltı ile birlikte verebilirsiniz.

Doktorunuz SUPRAVİT® PEDİATRİK ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer SUPRAVİT® PEDİATRİK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SUPRAVİT® PEDİATRİK kullandıysanız:

Çocuğunuz, SUPRAVİT® PEDİATRİK'ten kullanması gerekenden fazlasını kullanırsa bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SUPRAVİT® PEDİATRİK'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çocuğunuza çift doz SUPRAVİT® PEDİATRİK vermeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SUPRAVİT® PEDİATRİK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SUPRAVİT® PEDİATRİK kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (duyarlı bireylerde)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin SUPRAVİT® PEDİATRİK'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- A ve D vitamini fazlalığı (A vitamininin fazla alınmasına bağlı olarak kafa içi basıncı artar, kusma ve iştahsızlık gelişir. Yüksek dozda alınan D vitamini sonucu kemiklerden depo olarak bulunan belirgin derecede kalsiyumun serbest hale geçmesine bağlı olarak aşırı hiperkalsemi hali meydana gelir. Hiperkalsemi uzun sürerse özellikle bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerilemeye neden olur.)

Bunlar SUPRAVİT® PEDİATRİK'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SUPRAVİT® PEDİATRİK'in saklanması

SUPRAVİT®PEDİATRİK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SUPRAVİT®PEDİATRİK'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Bayer Consumer Care AG, İsviçre lisansı ile
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 34770
Ümraniye – İSTANBUL
Tel: 0 216 528 36 00
Faks: 0 216 645 39 50

Üretim Yeri: PharmaVision San. ve Tic. A.Ş., Topkapı - İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.